

HUILE 70 SUPÉRIEURE

INSECTICIDE

COMMERCIAL

ATTENTION POISON

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARANTIE:

Huile minérale: 99% Min.

N° D'HOMOLOGATION 14981

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

UNITED AGRI PRODUCTS CANADA INC

789 DONNYBROOK DR.

Dorchester, Ontario

N0L 1G5

CONTENU NET : 200 L

MODE D'EMPLOI

L'HUILE 70 SUPÉRIEURE est une huile minérale émulsionnable qui est utilisée pour la lutte contre certains insectes et tétranyques nuisibles qui attaquent les pommiers, les abricotiers, les poiriers, les pêchers, les pruniers, les rutabagas, les cerisiers acides et les arbres d'ornement. Son application, au moyen de n'importe quel appareil de pulvérisation courant, doit se faire selon le calendrier provincial des traitements et de façon à couvrir complètement les plantes. NE PAS APPLIQUER PAR VOIE AÉRIENNE.

NOTA : Ne pas traiter juste avant ou pendant une gelée, Couvrir complètement les plantes. Traiter par temps doux, mais pas en fin d'après-midi ni en soirée, afin que les arbres sèchent vite. Ne pas traiter si on prévoit une gelée avant que les arbres ne sèchent.

ARBRES FRUITIERS : Les doses à employer sur les arbres fruitiers sont exprimées en litres d'HUILE 70 SUPÉRIEURE par hectare et en litres d'HUILE 70 SUPÉRIEURE pour 1 000 d'eau. Cette dernière est la dose à employer lorsqu'on dilue la bouillie.

Culture et insectes	Volume par hectare	Volume pour 1 000 L	Moment propice au traitement
POMMIER Cochenille ostréiforme Tétranyque rouge du pommier Lécanies Cochenille virgule du pommier Tordeuse à bandes rouges Cochenille de San José	60 L	20 L	Traiter une fois entre le bouton vert et le bouton vert de 1 cm. NOTA: NE PAS employer l'HUILE 70 SUPÉRIEURE sur les variétés Red Delicious et Empire. En Ontario, l'écorce des pommiers Red Delicious peu vigoureux ont subi certains dégâts, sinon aucun.
ABRICOTIER Tétranyque rouge du pommier	60 L	20 L	Traiter entre la dormance et la préfloraison.
POIRIER Cochenille ostréiforme Tétranyque rouge du pommier Lécanies Cochenille virgule du pommier Psylle du poirier Cochenille de San José	60 L	20 L	Contre le psylle du poirier, les cochenilles et les lécanies, traiter à la dormance. Contre le tétranyque rouge du pommier, traiter au bouton vert.
PECHER Cochenille floconneuse du pêcher Tétranyque rouge du	60 L	20 L	Traiter entre la dormance et la préfloraison. Contre le tétranyque rouge du pommier, traiter entre le bouton vert de 1 cm et le bouton

pommier Cochenille de San José			rose. Ne traiter qu'une fois par saison.
PRUNIER Tétranyque rouge du pommier Lécánies Cochenille de San José	60 L	20 L	Traiter au bouton vert, dès le début du débourrement.
CERISIER ACIDE Tétranyque rouge du pommier	60 L	20 L	Traiter à la préfloraison, dès le début du débourrement.
BLEUET EN CORYMBE Lécánies	20 – 30 L	20 L	Ne faire qu'un seul traitement par an, par voie terrestre, pendant la dormance, en fin d'hiver, à raison de 1 000 L/ha dans le cas des petits buissons et de 1 500 L/ha dans le cas de gros.

ARBRES D'ORNEMENT

Employer 20 L d'HUILE 70 SUPÉRIEURE pour 1 000 L d'eau. Appliquer comme pulvérisation de dormance au début du printemps, lorsqu'il n'y a presque plus aucun risque de gelée la nuit, MAIS AVANT LE GONFLEMENT ET L'ÉCLATEMENT DES BORGEONS. Traiter le matin, par temps doux, afin que les arbres sèchent vite par la suite. Ne jamais traiter en fin d'après-midi ni durant une gelée.

ATTENTION : Pour prévenir les dégâts, NE PAS appliquer sur les arbres suivants:

Thuyas	Cocoiers	Érable du Japon	Noyers
Hêtres	Douglas taxifolié	Genévriers	Pin blanc
Noyer cendré	Caryers	Capillaire du Canada	Ifs
Épinette bleue	Houx	Érable à sucre	

NE PAS appliquer sur les arbustes et les arbres qui ne figurent pas sur la présente étiquette.

PLANTES-HÔTES	RAVAGEURS
POMMIERS (<i>Malus</i>) Pommottiers épine-vinettes Aubépines	Cochenille virgule du pommier Cochenille de San José Tétranyque rouge du pommier
FRÊNE (<i>Fraxinus</i>)	Cochenille virgule du pommier
ORMES (<i>Ulmus</i>)	Cochenille ostréiforme Lécánies Tétranyque rouge du pommier
PRUNUS Cerisiers florifères Pêchers	Tétranyque rouge du pommier Lécánies Cochenille de San José

Pruniers	
FÉVIERS (<i>Gleditsia</i>)	Cochenille floconneuse de l'érable
LILAS (<i>Syringa</i>)	Cochenille virgule du pommier
ÉRABLES (<i>Acer</i>) (sauf l'érable du Japon et l'érable à sucre)	Cochenille floconneuse de l'érable Lécánies
SORBIERS (<i>Sorbus</i>)	Tétranyque rouge du pommier
CHÊNES (<i>Quercus</i>)	Cochenille ostréiforme Lécánies Cochenille dorée du chêne Cochenille du chêne
PACHYSANDRES (<i>Pachysandra</i>)	Cochenille du fusain
PINS (<i>Pinus</i>) (sauf le pin blanc)	Cochenille des aiguilles du pin Tétranyque de l'épinette
ÉPINETTES (<i>Picea</i>) (sauf l'épinette bleue)	Cochenille des aiguilles du pin Tétranyque de l'épinette
TULIPIERS (<i>Liriodendron</i>)	Tétranyque du tulipier
SAULES (<i>Salix</i>)	Cochenille virgule du pommier

RUTABAGAS : L'HUILE 70 SUPÉRIEURE peut être utilisé sur les rutabagas pour dissuader les pucerons (les vecteurs du virus de la mosaïque du navet) de s'en nourrir. Appliquer 11 L d'HUILE 70 SUPÉRIEURE pour 550 à 1 100 L d'eau par hectare. Il est essentiel de bien en couvrir les plantes. L'application doit se faire à la pression de 2 500 kPa, avec des buses à jet en cône creux. Faire un traitement par semaine, à partir de la mi-juin ou dès l'apparition des pucerons. Consulter le bureau de vulgarisation agricole pour des renseignements plus précis sur l'activité des pucerons et le moment propice au traitements. Ceux-ci peuvent être nécessaires pendant jusqu'à 10 semaines après l'apparition des pucerons. Ne pas traiter moins de 21 jours avant la récolte.

ATTENTION : Ne pas appliquer l'HUILE 70 SUPÉRIEURE à la fumière directe du soleil. Traiter les rutabagas tôt le matin ou en soirée. Après l'application de l'HUILE 70 SUPÉRIEURE attendre au moins 24 heures avant de pulvériser d'autres insecticides. Ne pas appliquer l'HUILE 70 SUPÉRIEURE dans des solutions plus concentrées que celles qui sont recommandées, car la culture pourrait subir des dégâts.

MÉLANGE

L'HUILE 70 SUPÉRIEURE peut être utilisée seule avec de l'eau ou mélangée en cuve avec d'autres produits chimiques tels que le Cyprex, le Ferbam et le Benlate. NE PAS la mélanger avec le captane, le parathion, le Sevin ni le soufre mouillable. Quand on prépare une solution à base d'huile, verser d'abord l'agent chimique dans la cuve, alors que cette dernière est de 25 à 50 % pleine d'eau. Bien mélanger et ajouter l'HUILE 70 SUPÉRIEURE en dernier, alors que la cuve est presque pleine. Continuer d'agiter le contenu de la cuve jusqu'à ce qu'il ait été tout pulvérisé. Pour de plus amples renseignements sur la mélange, la compatibilité et la méthode d'application, consulter les experts ou les publications du ministère provincial de l'Agriculture.

ATTENTION

Ne pas employer la bouillie avant que l'huile ne soit en état d'émulsion ou si l'émulsion <<se brise>>. Ne pas traiter juste avant ou pendant une gelée. Faire marcher l'agitateur jusqu'à ce que la cuve soit vide. Ne pas employer moins de 30 jours avant ou après avoir employé du soufre.

PRÉCAUTIONS

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Tenir le produit à l'écart du feu, des flammes nues, des ampoules électriques allumées et des autres sources de chaleur. Ne pas respirer le brouillard de pulvérisation. Ne pas contaminer la nourriture destinée aux êtres humains ou aux animaux. Éviter tout contact du produit avec la peau et les yeux.

UTILISER AVEC PRUDENCE-NE PAS INGÉRER

Si vous prévoyez utiliser le produit antiparasitaire sur une denrée pouvant être exportée aux États-Unis et si vous avez besoin de renseignements sur les concentrations de résidus acceptables aux États-Unis, appelez au numéro 1-866-375-4648 ou consultez le site Internet www.cropro.org/.

PREMIERS SOINS

En cas de maladie, appeler un médecin. Ce produit contient des distillats de pétrole. En cas d'ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR, mais obtenir des soins médicaux ou contacter un centre antipoison IMMÉDIATEMENT. En cas de contact avec la peau, la laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer à grande eau pendant au moins 15 minutes et obtenir des soins médicaux ou contacter un centre antipoison. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administer un traitement symptomatique.

ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer au-dessous de 0° C. En cas d'entreposage accidentel au-dessous de 0° C, mettre les contenants dans un entrepôt chauffé (à 0° C au minimum); une fois réchauffée, agiter l'huile avant son emploi en roulant le fût et en le retournant plusieurs fois.

ÉLIMINATION

Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange de pulvérisation dans le réservoir.

Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.

Rendre le contenant inutilisable.

Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial.

S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi d'un tel produit dans des conditions dangereuses constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

AVIS À L'ACHETEUR : La garantie accordée par le vendeur se limite aux conditions énoncées sur l'étiquette et, sous cette réserve, l'acheteur assume les risques corporels ou matériels découlant de l'utilisation ou de la manipulation du produit et accepte celui-ci à cette condition.